

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygeny Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0,1,6 miesięcy i 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (fiolki – 1 ml). ENERGIX B INJ 20MCG/1ML X 10F (5-49 op.) Cena netto za 10 fiol. 497,50	szt.	150	49,75	7462,50	8%	8059,50
2.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typ B zawierająca : toksoid błonicy, toksoid tężcowy , toksoid krztuścowy (PT) hemaglutyninę włóknikową (FHA), pertaktynę (69 kDa-OMP), wirus polio typ 1, inaktywowany wirus polio typ 2, inaktywowany wirus polio typ 3, oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib. Przeznaczona dla dzieci od 2 miesiąca życia w schemacie szczepienia pierwotnego – 3 dawki i dawka uzupełniająca w drugim roku życia (ampułko-strzykawki po 0,5 ml z zawiesiną DTPa –IPV + fiołka z liofilizatem Hib+ 2 igły). INFANRIX IPV+HIB INJ 0,5ML X 1AMP-STRZ	szt.	70	123,51	8645,70	8%	9337,36
3.	Szczepionka skojarzona zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, trzy oczyszczone antygeny krztuśca [toksoid krztuścowy (PT), hemaglutynina włóknikowa (FHA) i pertaktyna] adsorbowane na wodorotlenku glinu, trzy typy inaktywowanego wirusa polio (typ 1, 2, 3) oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B (Hib), związany kowalencyjnie z toksoidem tężcowym, antygen powierzchniowy hepatitis B (ilości 10 mikrogramów). Szczepionka zawierająca: 1 ampułkostrzykawkę bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV-HBV) + 1 fiołka z proszkiem (Hib) + 2 igły. INFANRIX HEXA INJ 0,5ML X 1AMP-STRZ FS (500 - 1500 op.)	szt.	150	168,97	25345,50	8%	27373,14
4.	Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typu B zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, toksoid krztuścowy (hemaglutynina włóknikowa) inaktywowane wirusy polio typ 1, 2 i 3 oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B w postaci ampułkostrzykawki z igłą (zawiesina DTPa -IPV + fiołka z liofilizatem HIB).	szt.	50				

5.	Szczepionka przeciw zakażeniom rotawirusowym, zawierająca ludzki rotawirus w postaci zawiesiny doustnej, stosowana w schemacie dwudawkowym – 1 dawka 1,5 ml. ROTARIX ZAW. DOUSTNA 1,5ML X1D APLIK. FS (1-49 op.)	szt.	25	291,51	7287,75	8%	7870,77
6.	Szczepionka przeciw ospie wietrznej do stosowania od 9 miesiąca życia u dzieci i dorosłych, w schemacie dwudawkowym. VARILRIX INJ. PR.X 1F+ ROZP.X1A-S+2IG FS (80-499 op.)	szt.	50	190,67	9533,50	8%	10296,18
7.	Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokowym, skoniugowana, 13-walentna; zawiera sacharydy pneumokokowe; serotyp 6B skoniugowany białkiem nośnikiem ORM i adsorbowany na fosforanie glinu. Dawka 0,5 ml.	szt.	300				
8.	Szczepionka skoniugowana, czterowalentna, przeciwko meningokokom grup A,C,W 135 i Y, do stosowania powyżej 1 roku życia - ampułkostrzykawka 0,5 ml.	szt.	70				
9.	Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włóknkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami-pudełko po 1 szt.	szt.	150				
10.	Szczepionka do czynnego uodpornienia dzieci od 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B. 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml z igłą. BEXSERO INJ - 1 AMP-STRZYK. 0,5 ML FS (201 op.)	szt.	150	310,98	46647,00	8%	50378,76
11.	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce – żywa jedna dawka (0,5 ml). Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć. Liofilizowane komponenty odrzy, świnki i różyczki. Wskazana po ukończeniu 9 miesiąca życia, młodzieży i osób dorosłych. PRIORIX INJ.1F PR+AMP-ST ROZP+2 IGŁY FS	szt.	5	92,30	461,50	8%	498,42
12.	Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze - 10 ampułko-strzykawk po 0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawk)	op.	200				